

دليل إرشادي للمريض المدربين على المعالجة الذاتية لتخثر الدم

جزء 1 - قياس زمن البرواثرومبين بنفسك



- الرجاء قياس زمن البرواثرومبين مرة في الأسبوع وتسجيلها في بطاقة التخثر.
- الرجاء الانتباه خلال ذلك إلى إجراء القياس بشكل صحيح. وعلى الأخص، وضع قطرات الدم على شريحة الاختبار خلال 15 ثانية.
- إذا وقع زمن البرواثرومبين الخاص بك خارج النطاق العلاجي المستهدف منك، قم بتعديل الجرعة وقياس زمن البرواثرومبين مرة أخرى بعد يومين.
- الرجاء التشاور مع طبيبك، عند أي قيمة لزمن البرواثرومبين ينبغي عليك الاتصال به، إذا تعدد زمن البرواثرومبين النطاق المستهدف.
- في حالة تعدد زمن البرواثرومبين 4,5 يجب الاتصال بالطبيب على أي حال.
- تشاور كل ثلاثة شهور مع طبيب المنزل الخاص بك حول زمن البرواثرومبين.

جزء 2 - تخثر الدم



- يعتمد تخثر الدم على 3 أعمدة جدار الوعاء الدموي والصفائح الدموية ومعامل التخثر.
- لتكون معامل التخثر هناك حاجة إلى فيتامين ك. فيتامين ك يتم تناوله مع الغذاء وانتاجه في الأمعاء بواسطة البكتيريا.
- ت تكون عوامل التخثر في الكبد بمساعدة فيتامين ك.
- تطغى العقاقير الدوائية المثبتة للتخثر مثل ماركومار® أو كومادين® أو فاليتروم® إلخ على فيتامين ك في الكبد. بناء على ذلك يتم إنتاج عوامل تخثر أقل.
- بناء على ذلك يسْتَغرِقُ تخثر الدم فترة أطول بعض الشئ في حالة تناول هذه العقاقير الدوائية.
- هذا التأثير يمنحك الحماية ضد تكون جلطات أو خثار أو انسدام الأوعية في جسمك.

جزء 3 - تعديل الجرعة

- تبعاً للمرض سوف يقوم طبيبك بتحديد النطاق العلاجي المستهدف لك.
- الرجاء مراعاة، أن يظل زمن البرواثرومبين في النطاق العلاجي المستهدف. لأن القيم المتواجدة في النطاق المستهدف توفر لك أقصى قدر من الأمان بعدم الإصابة بالخثار/أنصمام الأوعية أو نزيف.
- إذا كان زمن البرواثرومبين في النطاق العلاجي المستهدف، استمر في تناول الجرعة المحددة لك من دوائلك.
- إذا كان زمن البرواثرومبين مرتفعاً، يرتفع خطر النزيف.
- إذا كان زمن البرواثرومبين منخفضاً، يرتفع خطر الخثار.



- إذا كان زمن البرواثرومبين ليس في النطاق العلاجي، فمن الضروري تعديل الجرعة.
- في حالة ارتفاع زمن البرواثرومبين يجب تناول أقراص أقل.
- في حالة انخفاض زمن البرواثرومبين يجب تناول أقراص أكثر.
- الرجاء مراجعة زمن البرواثرومبين مرة أخرى بعد يومين من تصحيح الجرعة.
- في حالة تواجد زمن البرواثرومبين مرة أخرى في النطاق العلاجي الخاص بك، يمكنك كما هو معتاد القياس بعد أسبوع وتناول أقراصك كما هو مخطط له.
- إذا كان زمن البرواثرومبين لا يزال خارج النطاق العلاجي الخاص بك، فمن الضروري إجراء تعديل آخر لجرعة الدواء. في هذه الحالة ينبغي قياس زمن البرواثرومبين بشكل عاجل.
- إذا تواجد زمن البرواثرومبين الذي تم قياسه في النطاق العلاجي، فيمكنك تناول دوائك كما هو مخطط له وإجراء القياس في وقت لاحق بعد أسبوع.
- إذا كان زمن البرواثرومبين لا يزال خارج النطاق العلاجي، فالرجاء الاتصال بطبيبك المعالج.



جزء 4 - التغذية وموافق خاصة

- الرجاء مراعاة أن المواد الغذائية المختلفة تحتوي على فيتامين ك بحسب مختلفة.
- طالما أنك تتغذى بشكل متوازن، فإنك تتناول في العادة فيتامين ك بشكل متساوي. إذا تغير بالفعل تناول فيتامين ك في غذائك بشكل شديد (على سبيل المثال من خلال الصيام، اتباع نظام غذائي، إلخ)، فمن الواجب عليك قياس زمن البرواثرومبين بشكل أكثر تكراراً.
- في حالة الضرورة قم بتصحيح جرعة أدوية تثبيط التخثر الخاصة بك، كما هو موصوف بشكل مفصل في الجزء 3.
- تناول الكحول يمكن أن يؤثر على زمن البرواثرومبين. من خلال قياس زمن البرواثرومبين بنفسك تستطيع التتحقق مما إذا كانت تتغير وإلى أي حد تتغير القيم عند تناول الكحول. في حالة الضرورة يجب تعديل الجرعة.
- الرجاء مراعاة، أن ترك تناول الأدوية أو التناول الإضافي لأدوية جديدة يمكن أن يؤثر على زمن البرواثرومبين. في هذا الحالات يرجى قياس زمن البرواثرومبين بشكل أكثر تكراراً.
- الرجاء إبلاغ طبيبك المعالج (على الأخص في حالة العمليات مثل الحقن أو الجراحات) بأنك تتناول أدوية مثبتة للتخثر.
- إذا كان من الواجب إجراء جراحة لك، يرجى التشاور مع الطبيب المعالج بما إذا كان من الواجب عليك إيقاف تناول الدواء المثبط للتخثر ومتي يجب عليك ذلك.
- استفسر أيضاً، بما إذا كنت بحاجة إلى أدوية أخرى لاجتياز العلاج.
- إذا كنت على سفر، فاصطحب معك جهاز CoaguChek® الخاص بك في حقيبة اليد.
- الرجاء أيضاً مراعاة، أن تأخذ معك بشكل كافي أدوية وشرائح اختبار وإبر وخز وبطاريات بديلة.



يجوز استخدام الصور بتصريح من مجموعة العمل أولريكا ديدجورجايتس لبرامج التدريب وبرامج العلاج المنظمة، © DiEM، معهد الطب البيهقي.